Grøn Agenda Sydhavn

Sommerfugleengens nye overdrevs-urter

(nye arter siden første høslæt i 2015)

Version 8-8-2020

L – Lystal

1. Dybskygge.
2. Dybskygge- til skygge.
3. Skygge, dog også på lysere steder.
4. Skygge- til halvskygge.
5. Halvskygge: kun undtagelsesvist i fuld lys.
6. Halvskygge- til halvlys.
7. Halvlys: mest i fuldt lys.
8. Halvlys-til Fuldlys: lysplante.
9. Fuldlys: kun på fuldt belyste steder.

R – Calciumtal (kalk)

1. Kraftigt syreindhold. Aldrig på svagt sure eller basiske jorde.
2. Mellem 1 og 3.
3. Syreindhold. Mest på sure jorde, men af og til på neutrale jorde.
4. Mellem 3 og 5.
5. Næsten neutral. Planterne findes på svagt sure jorde.
6. Mellem 5 og 7.
7. Svagt syreindhold til svagt baseindhold. Aldrig på stærkt sure jorde.
8. Mellem 7 og 9, dvs. viser for det meste kalkbund.
9. Basisk eller kalkholdigt. Altid på kalkrige jorde.

N – Kvælstoftal

1. Kvælstoffattigste voksesteder. Kun på de fattigste jorde og forsvinder ved gødskning.
2. Mellem 1 og 3
3. Kvælstoffattige voksesteder. Oftere på kvælstoffattige end på kvælstofrige jorde.
4. Mellem 3 og 5
5. Nogenlunde kvælstofrige voksesteder.
6. Mellem 5 og 7
7. Kvælstofrige voksesteder.
8. Mellem 7 og 9
9. Overvældende kvælstofrige voksesteder. Koncentreret på overgødede jorde.

L=9 R=9 N=1
(lys / kalk / kvælstof)

Den lille syd-eng 23. juni 2015

Første høslæt i den store eng 24. august 2015

Harekløver

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i de to små enge (2020).

Generelt:

L=8 R=2 N=1
(lys / kalk / kvælstof)

Enårig. Blomstrer juni-juli. Almindelig på strandoverdrev, skrænter, i vejkanter, klitter og på tørre sandede marker.

Bakkenellike

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i den lille syd-eng (2020).

Generelt:

L=8 R=3 N=2
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-august. Almindelig på overdrev, skrænter og sandet bund.

Liden klokke

Sommerfugleengen:

En eller få planter I den lille syd-eng (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=2
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-september. Lysåbne voksesteder med magre, tørre jorde, bl.a. skovbryn, vejkanter, overdrev og heder.

Liden skjaller

Sommerfugleengen:

I den lille syd-eng (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Enårig. Blomstrer maj-august. Snylter på især græssers rødder. Lysåbne voksesteder med jord, som er neutral er svagt sur. Ofte i klitter og enge, på strandenge, overdrev og heder.

NB. Liden Skjaller og dens former har brunt bæger. Det roder med former og underarter i både Stor og Liden Skjaller.

Pilealant

Sommerfugleengen:

En koloni i den store eng med spredning i lysninger og langs stier (2020).

Har ligeledes bredt sig på Tippen. Almindelig på det inddæmmede areal på Vestamager.

Generelt:

L=8 R=9 N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomsterer juli-august. Oprindelige voksested er tørre strandenge og strandoverdrev. Hist og her i Østdanmark på kalkholdig bund, ellers ret sjælden.

Blåhat

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i den lille syd-eng (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-august. Lysåbne voksesteder med veldrænet, tør bund og ringe kvælstofindhold, bl.a. tørre enge og overdrev.

Rundbælg

Sommerfugleengen:

I de to små enge, især den lille syd-eng (2020).

Generelt:

Flerårig. Blomstrer juni-juli.
Solåben, tør, kalkrig jord.
Pionerplante på rå og mager jord.
Selvforsynende med kvælstof.

Almindelig merian

Sommerfugleengen:

Breder sig i de to små enge (2020).

Generelt:

L=7 R=8 N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-september. Lysåbne steder med veldrænet, gerne kalkrig jord.

Hvid okseøje

Sommerfugleengen:

Breder sig i den store eng (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-juli. Lysåbne voksesteder med jord, som er ret tør, veldrænet og næringsfattig. Over hele landet i grusgrave, på overdrev, agerjord, enge og skrænter og vejkanter.

Almindelig kællingetand

Sommerfugleengen:

Større gruppe i den store eng og enkelte andre steder (2020).

Generelt:

L=7 R=7 N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-august. Almindelig på næringsfattig, solåben bund langs vejkanter, på skrænter, overdrev, grå klit og heder.

Gul snerre

Sommerfugleengen:

Enkelte steder i engene (2020).

Generelt:

L=7 R=7 N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-august. Almindelig på overdrev, vejkanter, sandede strandenge og i klitter.

Slangehoved

Sommerfugleengen:

En enkelt plante i den store eng (2020).

Generelt:

L=9 R=8 N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Toårig. Blomstrer juni-juli. Foretrækker tørre, lysåbne voksesteder med mager jord og neutralt eller basisk pH.

Almindelig brunelle

Sommerfugleengen:

Enkelte steder i engene, især i den lille nord-eng (2020).

Generelt:

L=7 R=7 N=X
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-september. Lysåbne græsarealer med et højt indhold af nitrat og kalk i jorden bl.a. skovkanter, overdrev og græssede enge.

Almindelig knopurt

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i den store eng og i lysninger (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=X
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-september. Foretrækker fuld sol eller let skygge på fugtig, lerholdig og humusrig jordbund.

Humlesneglebælg

Sommerfugleengen:

Mange steder i enge og lysninger (2020).

Generelt:

L=7 R=8 N=X
(lys / kalk / kvælstof)

En- eller toårig. Blomstrer juni-september. Findes overalt på overdrev og skrænter, i grusgrave og langsvejene. Selvforsynende med kvælstof.

NB Har sorte bælge.

Almindelig torskemund

Sommerfugleengen:

Breder sig i alle tre enge, især i den lille nord-eng (2020).

Generelt:

L=8 R=7 N=5
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-september. På tør, åben bund i klitter, på overdrev, vejkanter og dyrket jord.