

Version 16-7-2021

Grøn Agenda Sydhavn

Sommerfugleengens overdrevs-urter

(med nye arter jf. artslisten i et biologi-speciale fra 2010)

Biodiversitetsområde midt på Sydhavnstippen
(første høslæt på området var i 2015)

L – Lystal

1. Dybskygge.
2. Dybskygge- til skygge.
3. Skygge, dog også på lysere steder.
4. Skygge- til halvskygge.
5. Halvskygge: kun undtagelsesvist i fuld lys.
6. Halvskygge- til halvlys.
7. Halvlys: mest i fuldt lys.
8. Halvlys-til Fuldlys: lysplante.
9. Fuldlys: kun på fuldt belyste steder.

R – Calciumtal (kalk)

1. Kraftigt syreindhold. Aldrig på svagt sure eller basiske jorde.
2. Mellem 1 og 3.
3. Syreindhold. Mest på sure jorde, men af og til på neutrale jorde.
4. Mellem 3 og 5.
5. Næsten neutral. Planterne findes på svagt sure jorde.
6. Mellem 5 og 7.
7. Svagt syreindhold til svagt baseindhold. Aldrig på stærkt sure jorde.
8. Mellem 7 og 9, dvs. viser for det meste kalkbund.
9. Basisk eller kalkholdigt. Altid på kalkrige jorde.

N – Kvælstoftal

1. Kvælstoffattigste voksesteder. Kun på de fattigste jorde og forsvinder ved gødskning.
2. Mellem 1 og 3
3. Kvælstoffattige voksesteder. Ofte på kvælstoffattige end på kvælstofrige jorde.
4. Mellem 3 og 5
5. Nogenlunde kvælstofrige voksesteder.
6. Mellem 5 og 7
7. Kvælstofrige voksesteder.
8. Mellem 7 og 9
9. Overvældende kvælstofrige voksesteder. Koncentreret på overgødede jorde.

*L=9 R=9 N=1
(lys / kalk / kvælstof)*

Den lille syd-eng 23. juni 2015



A photograph of a large meadow. In the foreground, there is a dense patch of tall, bright green grass on the right side, and a mix of green and dry, yellowish-brown grass on the left. The middle ground is a vast field of dry, yellowish-brown grass. In the background, there is a line of trees and bushes. On the left, there are large, leafy green trees. On the right, there are bare, dark branches of trees or shrubs. The sky is not visible.

Første høslæt i den store eng 24. august 2015

Harekløver

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i de to små enge
(2020).

Generelt:

L=8 R=2 N=1
(lys / kalk / kvælstof)

Enårig. Blomstrer juni-juli.
Almindelig på strandoverdrev,
skrænter, i vejkanter, klitter og på
tørre sandede marker.



Ny på Sydhavnstippen

Bakkenellike

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i den lille syd-eng
(2020).

Generelt:

L=8 R=3 N=2
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-august.
Almindelig på overdrev, skrænter og
sandet bund.



Ny på Sydhavnstippen

Liden klokke

Sommerfugleengen:

En eller få planter I den lille syd-eng (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=2
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-september.
Lysåbne voksesteder med magre,
tørre jorde, bl.a. skovbryn, vejkanter,
overdrev og heder.



Ny på Sydhavnstippen

Liden skjaller

Sommerfugleengen:

Breder sig i den lille syd-eng (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Enårig. Blomstrer maj-august.
Snylter på især græssers rødder.
Lysåbne voksesteder med jord, som
er neutral er svagt sur. Ofte i klitter
og enge, på strandenge, overdrev og
heder.

NB. Liden Skjaller og dens former
har brunt bæger. Det roder med
former og underarter i både Stor og
Liden Skjaller.



Ny på Sydhavnstippen

Pilealant

Sommerfugleengen:

En koloni i den store eng med spredning i lysninger og langs stier (2020).

Har ligeledes bredt sig på Tippen. Almindelig på det inddæmmede areal på Vestamager.

Generelt:

L=8 R=9 N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomsterer juli-august. Oprindelige voksested er tørre strandenge og strandoverdrev. Hist og her i Østdanmark på kalkholdig bund, ellers ret sjælden.



Ny på Sydhavnstippen

Blåhat


Sommerfugleengen:

Enkelte planter i den lille syd-eng
(2020).

Generelt:

L=7 R=X N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-august.
Lysåbne voksesteder med
veldrænet, tør bund og ringe
kvælstofindhold, bl.a. tørre enge og
overdrev.



Ny på Sydhavnstippen

Rundbælg

Sommerfugleengen:

I de to små enge, især den lille syd-eng (2020).

Generelt:

Flerårig. Blomstrer juni-juli.
Solåben, tør, kalkrig jord.
Pionerplante på rå og mager jord.
Selvforsynende med kvælstof.



Ny på Sydhavnstippen

Blodkløver


Sommerfugleengen:

Enkelte steder i den store eng
(2020).

Generelt:

(mangler info)

Enårig. Blomstrer juni-juli.
Ynder kalk i jorden. Selvforsynende
med kvælstof.



Ny på Sydhavnstippen

Blæresmælde

Sommerfugleengen:

En enkelt plante i den lille syd-eng (2021).

Generelt:

L=8 R=7 N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-august.
Knyttet til lysåbne til halvskyggede voksesteder med en tør eller kun tidvis fugtig jord, fx på tørre overdrev, skrænter og vejkanter.



Ny på Sydhavnstippen

Farvegåseurt

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i den store eng
(2021).

Generelt:

L=8 R=6 N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig (eller sjældnere toårig).
Blomstrer juni-september. Vokser på
varme, ret tørre og veldrænede,
lysåbne eller svagt skyggede steder
med kalkrig, gruset jordbund, fx
langs skovkanter og vejskråninger.

Ny på Sydhavnstippen



Almindelig merian

Sommerfugleengen:

Breder sig i de to små enge (2020).

Generelt:

L=7 R=8 N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-september.
Lysåbne steder med veldrænet,
gerne kalkrig jord.



Ny i Sommerfugleengen

Hvid okseøje

Sommerfugleengen:

Breder sig i den store eng (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-juli.
Lysåbne voksesteder med jord, som er ret tør, veldrænet og næringsfattig. Over hele landet i grusgrave, på overdrev, agerjord, enge og skrænter og vejkanter.



Ny i Sommerfugleengen

Almindelig kællingetand

Sommerfugleengen:

Større gruppe i den store eng og enkelte andre steder (2020).

Generelt:

L=7 R=7 N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-august.
Almindelig på næringsfattig, solåben bund langs vejkanter, på skrænter, overdrev, grå klit og heder.



Ny i Sommerfugleengen

Gul snerre

Sommerfugleengen:

Enkelte steder i engene (2020).

Generelt:

L=7 R=7 N=3
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-august.
Almindelig på overdrev, vejkanter,
sandede strandenge og i klitter.



Ny i Sommerfugleengen

Slangehoved

Sommerfugleengen:

En enkelt plante i den store eng
(2020).

Generelt:

L=9 R=8 N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Toårig. Blomstrer juni-juli.
Foretrækker tørre, lysåbne
voksesteder med mager jord og
neutralt eller basisk pH.



Ny i Sommerfugleengen

Vild løg

(evt. sandløg)

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i den lille syd-eng
(2021).

Generelt:

L=7 R=7 N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-august.
Vokser på lysåbne eller let skyggede
steder på kalkrig, men ret
næringsfattig, veldrænet jord, fx på
overdrev, og i skove og krat.



Ny i Sommerfugleengen

Almindelig brunelle

Sommerfugleengen:

Enkelte steder i engene, især i den lille nord-eng (2020).

Generelt:

L=7 R=7 N=X
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-september.
Lysåbne græsarealer med et højt indhold af nitrat og kalk i jorden bl.a. skovkanter, overdrev og græssede enge.



Ny i Sommerfugleengen

Almindelig knopurt

Sommerfugleengen:

Enkelte planter i den store eng og i lysninger (2020).

Generelt:

L=7 R=X N=X
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-september.
Foretrækker fuld sol eller let skygge
på fugtig, lerholdig og humusrig
jordbund.



Ny i Sommerfugleengen

Humlesneglebælg

Sommerfugleengen:

Mange steder i enge og lysninger
(2020).

Generelt:

L=7 R=8 N=X
(lys / kalk / kvælstof)

En- eller toårig. Blomstrer juni-
september. Findes overalt på
overdrev og skrænter, i grusgrave og
langsvejene. Selvforsynende med
kvælstof.

NB Har sorte bælge.



Ny i Sommerfugleengen

Almindelig torskemund

Sommerfugleengen:

Breder sig i alle tre enge, især i den lille nord-eng (2020).

Generelt:

L=8 R=7 N=5
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-september.
På tør, åben bund i klitter, på overdrev, vejkanter og dyrket jord.



Ny i Sommerfugleengen

Skovfladbælg

Sommerfugleengen:

Større gruppe i den lille syd-eng med spredning enkelte andre steder i lysninger (2020).

Generelt:

L=7 R=8 N=2
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juli-august. Lysåbne steder med krat eller skovbryn, hvor jorden er veldrænet og gerne kalkholdig med et højt indhold af kalium. Selvforsynende med kvælstof. Almindelig på Øerne og i Nord- og Østjylland.



Hvid stenkløver

Sommerfugleengen:

Udbredte i engene (2020).

Generelt:

L=9 R=7 N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Toårig (eller kortlevende flerårig).

Blomstrer juli-september.

Lysåbne voksesteder med godt dræn
og et højt kalkindhold.

Selvforsynende med kvælstof.

Højt indhold af nektar i blomsterne.

Giftig for kreaturer som æder planten
frisk.

Hvid stenkløver, *Melilotus albus*,
krydser let med de gulblomstrede:
høj stenkløver, *Melilotus altissima* og
mark stenkløver, *Melilotus officinalis*.



Mark stenkløver

Sommerfugleengen:

Enkelte steder i engene (2020).

Generelt:

Formodentlig som hvid stenkløver.

Muligvis større tørkeresistens og bedre tilpasningsevne end hvid stenkløver.



Prikbladet perikon

Sommerfugleengen:

Nogle planter i nordenden af den store eng og i lysninger (2020).

Generelt:

Flerårig. Blomstrer maj-september. På overdrev, tørre enge, strandoverdrev, vejkanter og i lysåbne skove og krat. Den hører hjemme på tør og mager bund, hvor den klarer sig fint i konkurrencen med græsser.



Vild gulerod

Sommerfugleengen:

Udbredte i engene (2020).

Generelt:

L=8 R=X N=4
(lys / kalk / kvælstof)

Toårig. Blomstrer juni-august.
Gruset og veldrænet jord langs veje,
i grusgrave og grøftekanter.



Gulkløver

Sommerfugleengen:

Mange steder i enge og lysninger
(2020).

Generelt:

Enårig. Blomstrer maj-august.
Almindelig på overdrev, skrænter og
vejkanter. Selvforsynende med
kvælstof.

NB Har brune bælg



Hvidkløver

Sommerfugleengen:

Mange steder i enge og lysninger (2020).

Generelt:

L=8 R=6 N=6
(lys / kalk / kvælstof)

Flerårig. Blomstrer juni-september. Lysåbne voksesteder med en jordbund, der er fugtig, forholdsvis næringsfattig og svagt basisk, bl.a. i enge, på overdrev og skrænter og langs vejkanter. Selvforsynende med kvælstof. Klarer sig også på mere næringsrige græsmarker



Rødkløver

Sommerfugleengen:

Mange steder i enge og lysninger
(2020).

Generelt:

Flerårig. Blomstrer maj-september.
Almindelig på skrænter, overdrev og
enge. Selvforsynende med kvælstof.

